

Naudojimo instrukcija

Beta Guard Neu

Beta Guard Neu yra skystas, sudėtyje neturintis aldehydų, koncentratas, skirtas alkoholiams jautriems paviršiams ir medicinos priemonėms (prietaisams) dezinfekuoti. Ypač tinka naudoti įrangos ir objektų, esančių pacientų aplinkoje, taip pat paviršių ir objektų industrijoje, maisto pramonėje, viešojo maitinimo, skalbyklose dezinfekcijai. Priemonė pasižymi puikiomis valymo savybėmis. Tinka visiems vandeniu, šluostymui ir mirkymui atspariems paviršiams. Tinka visų rūšių dozavimo įrenginiams.

Sudėtis: 100 g koncentrato yra šios veikliosios medžiagos: 2,0 g 2-Phenoxyethanol, 7,0 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride 5,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Poveikis: veikia bakterijas, mieles, tuberkuliozę, mikobakterijas, inaktyvuoja virusus (įskaitant Vaccinia, Ankara, ŽIV, HBV, HCV, Influenza, Adeno, Noro, Rota, SV40).

Paskirtis: ypač tinka naudoti didelio užterštumo ir neigiamo kvapo erdvėms ir paviršiams (pvz. stalviršiai, lovos), medicinos priemonių (prietaisų) paviršiams, taip pat naudoti industrijos, maisto pramonės, maisto gamybos, skalbyklų, viešųjų erdvių, grožio salonų, slaugos ir globos namų ir kitų inventoriui, objektams ir paviršiams plauti ir dezinfekuoti.

Po nurodyto dezinfekcijos ekspozicijos laiko visi paviršiai, kontaktuojantis su maistu, turi būti perplauti geriamuoju vandeniu.

Atkreipkite dėmesį į koncentracijos ir ekspozicijos nuorodas. Dėl papildomos informacijos apie medžiagų suderinamumą, kreipkitės dėl išorinių nepriklausomų laboratorijų testų.

Naudojimas: atkreipkite dėmesį į koncentracijos ir ekspozicijos nuorodas.

Bakteriocidinis, mielicidinis poveikis (EN 13727, EN 13624, esant dideliame užterštumai), 0,5%-5 min.

Poveikis mikobakterijoms (EN 14348, įsk. M. terrae + M. avium) 2%-30 min.; 1%-60 min.

Poveikis virusams (EN 14476, apvalkalėtieji virusai) 1%-30 min.; 3%-5 min.

Sudrėkinkite paviršius ir užtikrinkite nurodytą ekspoziciją.

Nautoti medicinos priemonę atsakingai. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir etiketę.

Pakuotė:

2 litrų indas

5 litrų indas 10 litrų indas

Galiojimas: 3 metai po pagaminimo

Galiojimas po pakuotės atidarymo: 12 mėnesių

Gamintojas:

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35

D-47906 Kempen, Germany

+49(0)215255850

www.dr-deppe.de

Platintojas:

L.R.Tamulio firma „Meditalika“

Radvilų Dvaro g. 4,

LT-48320 Kaunas

tel. (8 37) 324501, (8 37) 206132

www.meditalika.lt

CE 0481



BETA GUARD NEU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Beta Guard Neu yra skystas koncentratas.

Įvairiems paviršiams, inventoriui ir kitiems objektams sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto gamybos ir ruošimo vietose, viešojo maitinimo objektuose, pramonės įmonėse, skalbyklose dezinfekuoti šluostant ir purškiant.

Tinka alkoholiui jautriems paviršiams.

Naudokite dozavimo priemones (tinka visų rūšių dozavimo įrenginiams) ir laikykitės dozavimo nurodymų (pvz., pagaminti 10 litrų 1 % darbinio tirpalo reikia 9,9 litrų vandens ir 100 ml. dezinfekanto koncentrato).

Prieš dezinfekciją nuo paviršių pašalinkite matomą purvą, nešvarumus. Sudrėkinkite paviršių dezinfekantu. Jeigu reikia, ant apruošiamų paviršių dezinfekantą paskleiskite švaria šluoste. Visą ekspozicijos laiką paviršius turi išlikti drėgnas. Paviršius, kurie kontaktuos su maistu, po dezinfekcijos nuplaukite švariu geriamuoju vandeniu.

Pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu, tuberkulicidiniu, mikobaktericidiniu poveikiu, virucidiniu poveikiu prieš virusus su apvalkalėliu, virucidiniu poveikiu prieš Adeno, Murine Noro (MNV) Polyoma (SV-40), Rota virusus.

Poveikis:

- baktericidinis naudojant 0,5 % tirpalą – 5 min. (EN 13727, EN 1276, EN 13697, nešvariomis sąlygomis);
- mielicidinis (EN 13624, EN 1650, nešvariomis sąlygomis) naudojant 0,5 % tirpalą – 5 min.
- tuberkulicidinis, mikobaktericidinis (EN 14348, nešvariomis sąlygomis, *M. terrae*, *M. avium*) 2 % – 30 min.; 1 % – 60 min.
- virucidinis poveikis prieš apvalkalinius virusus (EN 14476, nešvariomis sąlygomis) 1 % – 30 min.; 3 % – 5 min.
- virucidinis poveikis prieš Adeno ir Murine Noro (MNV) virusus (EN 14476, nešvariomis sąlygomis) naudojant 4 % tirpalą – 60 min., prieš Polyoma virusą SV-40 naudojant 2,0 % tirpalą – 60 min., prieš Rota virusą naudojant 1,0 % tirpalą – 30 min.

Atsargumo priemonės

Abejojant, kad Beta Guard Neu gali gadinti paviršių, išbandyti ant nedidelio ploto.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

54