

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4612
3 priedas

VITASEPT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Tik profesionaliesiems naudotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Paruoštas naudojimui Vitasept skirtas higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai (prieš operacijas, punkcijas ir kitas procedūras) sveikatos priežiūros įstaigose (operacinėse, procedūriniuose bei odontologijos kabinetuose ir kt.), higieninei rankų dezinfekcijai visuomeninės paskirties įstaigose (kosmetikos kabinetuose, kirpyklose ir kt.), maisto pramonės įmonėse ir odos dezinfekcijai prieš injekcijas, punkcijas, kraujo ėmimą.

Chirurginė rankų dezinfekcija

Švarias, sausas rankas (plaštakas ir dilbius) sudrėkinti 3-5 ml Vitasept (priklausomai nuo delnų dydžio), masažuojant įtrinti į odą; Bendras ekspozicijos laikas – 90 sek. Rankos turi būti drėgnos visą šį laiką.

Higieninė rankų dezinfekcija

Švarias, sausas rankas sudrėkinti 3 ml Vitasept ir kruopščiai įtrinti į odą; ekspozicijos laikas – ne mažiau 30 sek.

Esant adenoviruso grėsmei

Švarias, sausas rankas sudrėkinti 5 ml Vitasept ir kruopščiai įtrinti į odą; ekspozicijos laikas – 60 sek.

Odos dezinfekcija

Prieš injekcijas, kraujo ėmimą, skiepus Vitasept tirpalu sudrėkintu tamponu trinti odą 15 sek., prieš punkcijas – 60 sek. Palaukti, kol odos paviršius išdžius.

Bakteriocidinis, fungicidinis, virucidinis, mikobaktericidinis efektyvumas įrodytas laboratoriniais tyrimais pagal EN 1500, EN 1275, EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14348, DVV/RKI.

Atsargumo priemonės

Nenaudoti gleivinių, žaizdų ir veido odos dezinfekcijai.

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniam asmenims neprieinamoje vietoje.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-06-17